

# OCUflash®

Chlorid sodný 7 mg/ml

Oční kapky, roztok

## 1. Co je OCUflash® a na co se používá

OCUflash® je speciální oční (isotonický, pufovaný) roztok s přísadkou výtažku ze světlíku lékařského. Je určen ke vkapávání do očí nebo k výplachům očí. Výtažek ze světlíku lékařského působí v oku protizánětlivě, dezinfekčně a adstringentně (svíravě). Tyto vlastnosti světlíku lékařského se již dlouhodobě využívají ke zklidnění očí, k prevenci a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů víček a spojivek.

## 2. Co potřebujete vědět před tím, než použijete OCUflash®

OCUflash® nesmí být používán při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku.

OCUflash® mohou požívat dospělí, děti i mladiství. Vzhledem k bezpečnosti přípravku je možno jej podávat i novorozencům, kojencům, těhotným ženám a kojícím matkám.

Pokud jsou současně používány i jiné oční kapky anebo oční mast, je vhodné je aplikovat do oka nejdříve po pěti minutách po aplikaci přípravku OCUflash®.

## 3. Jak používat OCUflash®

OCUflash® je ideální výplachový roztok pro odstranění čehokoliv cizího z oka. Bez porady s lékařem může být použit jak k jednoduchému krátkodobému výplachu, tak i ke vkapávání do očí nebo k obkladům víček. Přípravek se používá při nepříjemných pocitech v oku jako je pálení, řezání, svědění a pocit cizího tělesa v oku. V praxi je OCUflash® ideální použít například:

1. k vymývání oka při odstraňování cizích tělísek, prachu a chlóvané vody z oka,
2. jako první pomoc po poleptání očí kyselinou nebo zásadou (vápnem, maltou)
3. ke zklidnění očí při lehčích, neinfekčních formách zánětů spojivek a zánětů okrajů víček,
4. k odstranění krust a k vymývání hlenu a hnisu z oka před aplikací antibiotik u hnisavých zánětů očí
5. k odstraňování šupinek z okrajů víček při vleklých zánětech víčkových okrajů
6. k výplachům oka po nošení kontaktních čoček (zvláště těch tvrdých)
7. v praxi očního lékaře k výplachům oka po aplanační tonometrii nebo gonioskopii
8. k odstraňování kosmetických přípravků z okolí oka, víček a řas

**Dávkování:** Ke zklidnění očí a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů spojivek a víček vkapáváme do dolního spojivkového vaku 1-2 kapky 1-4x denně. Při výplachu čehokoliv cizího z oka aplikujeme roztok až do doby odstranění cizorodé látky či cizích tělísek, popřípadě do zmírnění obtíží.

Po odšroubování uzávěru lahvičky je OCUflash® připraven k použití. Pacient mírně zakloní hlavu, obrátí lahvičku dnem vzhůru a stlačením lahvičky z plastu vkápne do dolního spojivkového vaku požadovaný počet kapek. Množství aplikovaného roztoku závisí na způsobu použití. Chceme-li oko vypláchnout, stlačíme lahvičku tak, až dosáhneme, že vyteče požadované množství roztoku. Při zánětech víček je možné roztok použít i k obkladům. Při jakékoliv manipulaci dbáme na to, aby se kapátko lahvičky nedotklo oka, víček nebo řas. Tím bráníme znečištění a kontaminaci přípravku. Po použití uzávěr kapátka pevně zašroubujeme a lahvičku uchováme ve svislé poloze.

**Upozornění:** OCUflash® neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel, obsluze strojů a práci ve výškách, které vyžadují zvýšenou

pozornost. Při aplikaci do spojivkového vaku však může ojediněle přechodně dojít k rozmazanému vidění. Proto výše jmenované činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

Při předávkování či náhodném požití přípravku dítětem je léčba symptomatická.

Pacient nesmí současně s používáním přípravku *OCUflash*<sup>®</sup> nosit měkké kontaktní čočky. Po dobu používání přípravku není vhodné nosit ani tvrdé kontaktní čočky. Nelze-li jinak, je vhodné, aby si před aplikací přípravku *OCUflash*<sup>®</sup> pacient kontaktní čočky z oka vyjmul a nasadil si je zpět nejdříve 20 minut po nakapání přípravku do oka.

#### 4. Jaké jsou možné vedlejší účinky

*OCUflash*<sup>®</sup> je velmi dobře snášen. U citlivých jedinců se bezprostředně po aplikaci může vyskytnout přechodné mírné pálení. Může se vyskytnout i reakce přecitlivělosti.

**Interakce:** Nejsou dosud známy.

#### 5. Co *OCUflash*<sup>®</sup> obsahuje

Chlorid sodný 7 mg v 1 ml

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid 0,04mg v 1ml (0,004%), dihydrát edetanu disodného, chlorid draselný, hexahydrát chloridu horečnatého, polysorbát 80, výtažek ze světlíku lékařského, borax, hydroxid sodný, voda pro injekci.

#### 6. Jak uchovávat *OCUflash*<sup>®</sup> a další informace

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Tato doba je uvedena na štítku lahvičky nebo na papírové krabičce u ikony přesýpacích hodin. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Otevřené balení spotřebujte do 28 dní.

#### Velikost balení:

1x10ml, 2x10ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o.

Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 243 333 786

Fax: +421 243 638 743

e-mail: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)

[www.unimedpharma.eu/cz/](http://www.unimedpharma.eu/cz/)



**Datum poslední revize textu:** červenec 2016